

### 骨が壊れるのを抑える薬

ビスホスホネート製剤	内服薬（ボナロン・ベネット・ボノテオ） または注射（当院では、ボンビバ注射 （1ヶ月に1回））で治療します。
抗ランクルモノクローナル抗体製剤	注射（当院では、プラリア注射 （6ヶ月に1回））で治療します。
選択的エストロゲン受容体モジュレーター （SERM）製剤	閉経後の方が対象。 内服薬（エビスタ・ビビアント）で治療します。

### 骨を作る働きを助ける薬

副甲状腺ホルモン（RTH）製剤	注射（当院では、テリボン注射 （1週間に1回））で治療します。
-----------------	------------------------------------

### 骨を壊す働きを抑え、骨を作る働きを助ける薬

抗スクレロスチン抗体製剤	注射（当院では、イベニティ注射 （1ヶ月に1回））で治療します。
--------------	-------------------------------------

### 骨の材料の補充、または骨の代謝を助ける薬

活性化ビタミン D <sub>3</sub> 製剤	内服薬で治療します。
カルシウム製剤、ビタミン K <sub>2</sub> 製剤	
ビタミン K <sub>2</sub> 製剤	

### 骨粗しょう症にともなう痛みを軽くする薬

カルシトニン製剤	注射で治療します。
----------	-----------